

(P-17) ALKOL BAĞIMLILIĞI EŞTANISI OLAN GENELLEŞMİŞ ANKSİYETE BOZUKLUĞU VAKALARINDA BİLİŞSEL VE BEDENSEL BULGULARIN DAĞILIMI VE KARŞILAŞTIRMASI

Armağan Y.Samancı, Sinan Orhan, Hüsnü Erkmen

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
drsamanci@yahoo.com.tr

GİRİŞ VE AMAÇ: Alkol Bağımlılığındaki anksiyeteyi gösteren birçok bilişsel ve bedensel bulgular bulunmaktadır. Ayrıca alkol yoksunluğunun oluşturduğu semptomlar arasında anksiyete de belirgin bir yer işgal etmektedir(1). İlâveten anksiyete bozukluğu ile alkol bağımlılığı arasındaki bilişsel ve bedensel belirtilerin ayrımı bazı çalışmalarda bir belirti haricinde bulgu çıkartmamıştır(2). **GEREÇ VE YÖNTEM:** Çalışmamızda alkol bağımlılığıda olan genelleşmiş anksiyete bozukluğu vakalarında bilişsel ve bedensel belirtiler, alkol bağımlılığı olmayan genelleşmiş anksiyete vakaları ile karşılaştırılmış ve semptomlarda özgüllük aranmıştır. **BULGULAR:** Toplam 70 vakanın dahil edildiği çalışmada 24 ayrı bilişsel ve bedensel semptom taraması yapılmış ve bunlar karşılaştırılmıştır. 24 ayrı semptom %18.2 ile %87.9 sıklık yelpazesi arasında yer almıştır. Alkol bağımlılığı olan ve olmayan genelleşmiş anksiyete vakalarında bu semptomlar karşılaştırıldığında ilginç olarak sadece bir semptomda istatistiki olarak anlamlılık ortaya çıkmıştır. **TARTIŞMA VE SONUÇ:** Alkol bağımlılığı olmayan genelleşmiş anksiyete bozukluğu vakalarında bulantı-kusma semptomu alkol bağımlılığı olanlara göre istatistiki olarak daha anlamlı derecede fazladır(ki-kare:5.083,sd:1,p=0.024).Çalışma tüm semptom taramasının detaylarını karşılaştırmalı olarak istatistiksel incelemiştir.

KAYNAKLAR

- 1.Schuckit MA,Monterio MG.Alcoholism,anxiety and depression .Br J addiction Dec;83(12)1373-80,1988
- 2.George DT,Zerby A.Panic attacks and alcohol withdrawal;can subjects differentiate the symptoms?Biol Psych,24;240-243,1988